

## Corrigé du sujet SVT : grossesses précoces en Picardie

<b>11.</b> 31 jours	1
<b>12.</b> 17 janvier et 17 février	2
Réponses partielles :	
- 17 janvier / 18 février	1,5
- 18 janvier / 17 février	1,5
- 18 janvier / 18 février	1
- 18 janvier / autre date que 17 ou 18 février	0,5
- Autre date que 17 ou 18 janvier / 18 février	0,5

Il n'est pas attendu de phrase construite dans les 2 premières questions dès lors que la réponse est juste.

### II - Eléments de correction du paragraphe argumenté :

Problématique	Lola peut encore pratiquer une IVG médicamenteuse pendant 2 jours (au-delà, il restera la possibilité d'une IVG chirurgicale), puis choisir un moyen de contraception.
Eléments scientifiques	<p><u>Choix d'une méthode d'interruption pour sa grossesse</u></p> <p>Le test de grossesse est réalisé 32 jours après le rapport sexuel. (doc 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il est trop tard pour la pilule du lendemain qui doit être prise dans les 72 heures suivant le rapport. (doc 2)</li> <li>- L'interruption volontaire de grossesse est possible jusqu'à la 14<sup>ème</sup> semaine d'aménorrhée, c'est donc réalisable. (doc 3)</li> <li>- L'IVG médicamenteuse est possible jusqu'à 7 semaines après les règles, soit jusqu'au samedi 21 avril. (doc 3)</li> </ul> <p><b>Il reste donc deux jours pour une IVG médicamenteuse..</b></p> <p><u>Choix d'une méthode pour éviter une nouvelle grossesse</u></p> <p>Il faut choisir une méthode de contraception.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La pilule du lendemain n'est pas adaptée pour une utilisation contraceptive régulière ou occasionnelle. (doc 2)</li> <li>- Les préservatifs sont une bonne méthode car ils conviennent pour des rapports épisodiques et sont peu coûteux. (doc 4)</li> <li>- La pilule peut convenir à une jeune femme contrairement au dispositif intra-utérin qui est peu adapté. (doc 4)</li> </ul>
Expression écrite	Respect de la forme : le message s'adresse à Lola (C1)

### Exemple de réponse possible

« Le rapport sexuel a eu lieu il y a 32 jours. Il est possible de réaliser une interruption volontaire de grossesse jusqu'à la 14<sup>ème</sup> semaine. L'IVG médicamenteuse est réalisable jusqu'à la 7<sup>ème</sup> semaine suivant les dernières règles, c'est-à-dire jusqu'au samedi 21 avril. Il reste donc deux jours pour une IVG médicamenteuse. Au-delà vous devrez avoir recours à une IVG chirurgicale.

Pour éviter que cela se reproduise, il va falloir adopter une méthode de contraception adaptée. Les préservatifs sont bien adaptés à votre situation : des rapports épisodiques. Ils ont l'avantage d'être peu coûteux et de protéger des infections sexuellement transmissibles. La pilule peut convenir mais il peut y avoir parfois des contre-indications médicales. C'est en revanche très fiable »

### Barème

Choix d'une méthode pour interrompre la grossesse				
Justification satisfaisante	Justification partielle		Pas de justification	
Les éléments scientifiques essentiels sont présents ; l'élève indique qu'une IVG médicamenteuse est réalisable	Peu d'éléments scientifiques sont présents ; l'élève indique qu'une IVG médicamenteuse est réalisable.	Peu d'éléments scientifiques sont présents ; l'élève indique qu'une IVG est nécessaire sans préciser davantage.	L'élève se contente d'indiquer qu'elle doit réaliser une IVG	Pas de réponse ou mauvais choix (pilule du lendemain ou moyen de contraception)
4 - 3	2,5	2	1	0

Choix d'une méthode de contraception				
Justification satisfaisante	Justification partielle		Pas de justification	
Les éléments scientifiques sont présents ; l'élève indique qu'elle doit utiliser un préservatif et/ou la pilule.	Des éléments scientifiques sont présents ; l'élève indique qu'elle doit utiliser un préservatif et/ou la pilule.		L'élève se contente d'indiquer qu'elle doit utiliser un préservatif et/ou la pilule	Pas de réponse ou mauvais choix (pilule du lendemain ou DIU)
4 - 3	2		1	0